

CARPETA	Fecha	Código	Versión
FICHAS TÉCNICAS	01/06/2006	PD-FT-00	01.01

AGROTOX 58.8% WP PD-FT- (01.01)

FORMULACION.

AGROTOX 58.8%WP, es un fungicida formulado como polvo mojable, que contiene 588 gramos de oxicloruro de cobre por kilogramo de formulación, equivalente a 350 gramos de cobre.

QUE ES AGROTOX 58.8%WP?

AGROTOX 58.8%WP es un fungicida preventivo a base de OXICLORURO DE COBRE, del grupo de las sales de cobre, de amplio espectro, eficaz en la prevención de enfermedades en diversos cultivos.

COMO ACTUA AGROTOX 58.8%WP?

AGROTOX 58.8%WP inhibe la transferencia de electrones en la respiración, en el metabolismo energético en el ciclo de Krebs y en la fosforilación oxidativa.

COMPOSICION Y CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS.

PRODUCTO GRADO TECNICO

Ingrediente Activo: Oxicloruro de cobre Nombre Químico: Oxicloruro de cobre Grupos químicos: sales de cobre

Apariencia Física: cristales de color verde a azul.

PRODUCTO FORMULADO:

Apariencia: cristales de color verde a azul.

COMPATIBILIDAD.

Incompatible con productos a base de carbaril y maneb y zineb.

PRECAUCIONES.

Leer la etiqueta antes de usar el producto. Evitar la inhalación, el contacto con la piel, los ojos y la ropa.

Quitar y lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar.

RECOMENDACIONES Y DOSIS.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS Y RECOMENDACIONES	PERIODO DE CARENCIA (PC)
TOMATE	Gota (Phytophthora infestans).	300-500 g por 100 l de agua, de	



CARPETA	Fecha	Código	Versión
FICHAS TÉCNICAS	01/06/2006	PD-FT-00	01.01

PAPA	Tizón temprano (Alternaría solani) Gota (Phytophthora infestans), Tizón temprano (Alternaría solani)	acuerdo al tamaño del cultivo y grado de infestación de la enfermedad.	-
PLATANO	Sigatoka, chamusca (<i>Cercospora musae</i>)		-
TABACO	Mildiu o moho azul (Peronospora tabacina)	300-500 g por 100 l de agua, de	-
VID	Mildiu (Plasmopara viticola, Peronospora vitícola)	acuerdo al tamaño del cultivo y grado de infestación de la	-
SOYA	Mildeo (Peronospora manshurica)	enfermedad.	-
CAFE	Mancha de hierro (Cercospora coffeicola), Roya (Hemileia vastatrix)		-

MODO DE EMPLEO.

Se recomienda aplicar **AGROTOX 58.8%WP** cuando se observe la aparición de los primeros síntomas de las enfermedades y en frutales antes de la floración.

TOXICOLOGIA.

AGROTOX 58.8%WP esta clasificado como Medianamente Toxico, Categoría Toxicológica III.

PRECAUCIONES

Mantenga el producto en su envase original, bien cerrado y fuera del alcance de los niños, lejos de los productos alimenticios, personas irresponsables y animales domésticos. No almacenar dentro de las casa de habitación.

Utilice mascara, gafas, guantes botas y overoles al momento de efectuar la aplicación. No contamine las fuentes de agua.

Los envases que hayan contenido plaguicidas deben ser dispuestos de la siguiente forma: hágales el triple lavado, inutilícelos sin destruir la etiqueta y llévelos a los sitios de recolección para su disposición final.

VENTAJAS DE USAR AGROTOX 58.8%WP.

- -Acción fungicida protectante preventiva.
- Baja toxicidad para mamíferos y aves. Inocuo para el medio ambiente.
- Mejor protección al cultivo, lo cual refleja una cosecha mas abundante y de mejor calidad.
- AGROTOX 58.8%WP no es fitotóxico.
- Mejor control a bajo precio.



CARPETA	Fecha	Código	Versión
FICHAS TÉCNICAS	01/06/2006	PD-FT-00	01.01

PRESENTACION.

AGROTOX 58.8% WP, se comercializa en presentaciones de:

- ₩ Bolsa de 500 g.
- Bolsa de 1 kg.

REGISTRO DE VENTA ICA 1194

CATEGORIA TOXICOLOGICA III MEDIANAMENTE TOXICO

RESPONSABLE: GONZALO PAVA I.A. DIRECTOR DEPARTAMENTO DE GESTION TECNICA Y AMBIENTAL. AGRICENSE LTDA.